



廣貫堂 ×



# お薬相談会【風邪のお薬】



## 総合感冒薬

### JAPAN

### THAILAND

#### ★医療用医薬品

##### PL配合顆粒

■成分・含量(1g中)  
 サリチルアミド270mg  
 アセトアミノフェン150mg  
 無水カフェイン60mg  
 プロメタジンメチレンジサリチル酸塩13.5mg  
 ■用法・用量  
 成人に1日4回

##### 幼児用PL配合顆粒

■成分・含量(1g中)  
 サリチルアミド45mg  
 アセトアミノフェン25mg  
 無水カフェイン10mg  
 プロメタジンメチレンジサリチル酸塩2.25mg  
 ■用法・用量  
 2～4歳1回1g(1包)1日4回  
 5～8歳1回2g(2包)1日4回  
 9～11歳1回3g(3包)1日4回

#### ★一般医薬品(OTC)

##### パブロンゴールドA微粒

※パブロンゴールドA錠は同処方、15歳以上が3錠、11～14歳が2錠、11歳未満が服用しないこと  
 ■成分・含量(1g中)  
 ジヒドロコデインリン酸塩 8mg  
 dl-メチルエフェドリン塩酸塩 20mg  
 グアイフェネシン 41.67mg(3包中125mg)  
 アセトアミノフェン 300mg  
 リゾチーム塩酸塩 20mg(力価)  
 マレイン酸カルビノキサミン 2.5mg  
 無水カフェイン 25mg  
 ビスイブチアミン(ビタミンB1誘導体) 8mg  
 リボフラビン(ビタミンB2) 4mg  
 添加物:セルロース、パレイショデンブ、ヒドロキシプロピルセルロース、無水ケイ酸、リン酸水素Ca、グリチルリチン酸2K、メタケイ酸アルミン酸Mg、香料、バニリン  
 ■用法・用量  
 1～2歳1回(1/4包)1日3回  
 6～6歳1回(1/3包)1日3回  
 7～10歳1回(1/2包)1日3回  
 11～14歳1回(2/3包)1日3回  
 15歳以上1回(1包)1日3回  
 ※食後なるべく30分以内に水又はぬるま湯で服用

#### ★一般市販薬

##### COLD-TAB

■成分・含量(1錠中)  
 パラセタモール500mg(熱)  
 プロムフェニラミン4g(鼻)  
 デキストロメルファン15mg(咳)  
 ■用法・用量  
 1回1～2錠、1日3～4回  
 ※小児に関してはご相談ください。



100THB

タイで発売されている数少ない総合感冒薬です。当店で扱っております。

## 発熱・喉の痛みを抑える成分薬

### JAPAN

### THAILAND

#### ★一般医薬品(OTC)

#### ★一般市販薬

##### カロナール

■成分・含量(1錠中)  
 アセトアミノフェン  
 ■用法・用量  
 1回300～500mgを頓服。  
 原則1日最大1500mgまで  
 ※小児に関してはご相談ください。

##### ベンザブロック

■成分・含量(1錠中)  
 イブプロフェン  
 ■用法・用量  
 1回200mgを頓服。  
 原則1日最大600mgまで  
 ※小児に関してはご相談ください。

★イブプロフェン  
 副作用(胃腸痛)を抑える為に食後にお飲みください。

##### TYLENOL

■成分・含量(1錠中)  
 パラセタモール500mg  
 ■用法・用量  
 成人1回1～2錠、1日3～4回  
 ※子供用シロップもあります。



12～65THB

##### NUROFEN・BUFLEX

■成分・含量(1錠中)  
 NUROFEN  
 イブプロフェン200mg、400mg  
 BUFLEX  
 イブプロフェン400mg、600mg  
 ■用法・用量  
 成人1回1～2錠、1日3～4回  
 ※子供用シロップもあります。



22～65THB

40～70THB

# 鼻水・鼻づまりを抑える成分薬

JAPAN		THAILAND	
★医療用医薬品		★一般市販薬	
<b>ヒスタクール</b> ■成分・含量 クロルフェニラミン ■用法・用量 1回2～6mg。1日2～4回。 ※小児に関してはご相談ください。	<b>CHLIRAHIST</b> ■成分・含量 Chlorpheniramine ※当店では4mgの錠剤を取り扱っております。子供用シロップもあります。	<b>NASOL</b> ■成分・含量 naphazoline ※当店では鼻用のスプレーを扱っております。	<b>SULIDINE</b> ■成分・含量 Chlorpheniramine+phenylephrine ※当店では錠剤(chlorpheniramine4mg /phenylephrine10mg)と子供用のシロップを扱っています。
★一般医薬品(OTC)			
<b>ナザール</b> ■成分・含量 ナファゾリン ■用法・用量 1回2～4滴。1日滴数回点鼻。 ※小児には使用しないことが望ましい。	 20～50THB	 85THB	 40～50THB

# 喉の痛みを抑える成分薬

JAPAN		THAILAND	
★医療用医薬品	★一般医薬品(OTC)	★一般市販薬	
<b>ボルタレン</b> ■成分・含量 diclofenac sodium ■用法・用量 1回25～50mg。原則1日2回。 1日最大100mgまで。 ※1日3回、1錠の処方が多いです。 小児に関してはご相談ください。	<b>ロキソニン</b> ■成分・含量 loxoprofen ■用法・用量 1回60mg頓用原則1日2回まで 最大1日180mgまで。 ※小児に対する安全性が確立しておらず、 適応はない	<b>VOLTARENE,DIFERENE</b> ■成分・含量 diclofenac sodium ※当店では25,50,75,100mgを取り扱っています。	<b>JAPROLOX</b> ■成分・含量 loxoprofen ※当店では60mgを取り扱っています。
		 20～280THB	 220THB


# 痰切れを良くする・痰を出しやすくする成分薬

JAPAN		THAILAND	
★医療用医薬品		★一般市販薬	
<b>ムコダイン</b> ■成分・含量 カルボシステイン ■用法・用量 1回500mg。1日3回。 ※小児に関してはご相談ください。	<b>MURHINOL,FLEMEX</b> ■成分・含量 carbocisteine ※当店では375mgの錠剤を扱っています。 シロップも扱っています。	<b>BISOLVON</b> ■成分・含量 bromhexine ※当店ではシロップを扱っています。	<b>MUCOSOLVAN</b> ■成分・含量 ambroxol ※当店では30mg、75mgの錠剤を扱っています。 シロップも扱っています。
<b>ビスルボン</b> ■成分・含量 プロムヘキシン ■用法・用量 1回4mg。1日3回。 ※小児に関してはご相談ください。	 40～95THB	 45～95THB	 60～200THB

## ■ボルタレンに関して

ボルタレンを使用する際、胃薬を処方されることが多い。  
 ボルタレンの副作用の胃潰瘍を防ぐ目的。  
 これら、発痛物質を和らげる薬剤に加えて、抗生物質を処方するクリニックでは、吸入を行ったり、喉に直接薬液を塗布したりする。

# 咳を止める成分薬

JAPAN	THAILAND
★一般医薬品(OTC)	★一般市販薬
<b>メジコン</b> ■成分・含量 デキストロメトルファン ■用法・用量 1回15～30mg。1日1～4回。 ※小児に関してはご相談ください。	<b>DEXTROMETAPHAN</b> ■成分・含量 dextrometaphan ※当店では15mgの錠剤を扱っています。
日本で良く使われている コデインはタイでは薬事法 の関係で使用できません。	 <b>50THB</b>



## 抗生物質 (抗生物質は、細菌感染に有効。単一臓器の処方のみを使用)

JAPAN	THAILAND	JAPAN	THAILAND
ペニシリン系		キノロン系	
<b>パセトシン</b> ■成分・含量 アモキシシリン ■用法・用量 1回250mg。3～4回服用。 ※小児に関してはご相談ください。	<b>AMOXYM.H.,IBIAMOX</b> ■成分・含量 amoxicillin ■用法・用量 1日朝夕食後1カプセル服用。 ※当店では、500mgカプセルを扱っています。	<b>シプロフロキサシン</b> ■成分・含量 シプロフロキサシン ■用法・用量 1回200mg、1日3回食後。	<b>CIFLOXIN</b> ■成分・含量 Ciprofloxacin ■用法・用量 1日2回食後1カプセル服用。 ※当店では500mgカプセルを扱っています。
マクロライド系		<b>オフロキサシン</b> ■成分・含量 オフロキサシン ■用法・用量 1回200mg、1日3回食後。	<b>OFLOXIN</b> ■成分・含量 Ofloxacin ■用法・用量 1日2回食後1カプセル服用。 ※当店では200mgカプセルを扱っています。
<b>クラリス、クラシッド</b> ■成分・含量 クラリスロマイシン ■用法・用量 1回200mg、1日2回	<b>KLACID</b> ■成分・含量 clarithromycin ■用法・用量 1日1回食後1カプセル服用。	 <b>100THB</b>	 <b>70THB</b>
 <b>500THB</b>		 <b>30～40THB</b>	